

Plaaslike kwaliteit van die 2012/2013-sojaboonoes bekyk

JOLANDA NORTJÉ, bestuurder: Laboratorium, Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium

Sojabone lewer tans die derde grootste bydrae tot die bruto waarde van landboupprodukte ná mielies en koring in Suid-Afrika. Plaaslike persaanlegte brei vinnig uit en siende dat Suid-Afrika meer as die helfte van Afrika se sojabone produseer, is dit baie belangrik dat goeie kwaliteit sojabone plaaslik geproduseer word.

In totaal is 150 monsters, wat die soja-oes proporsioneel verteenwoordig, gegradeer en geanaliseer tydens hierdie kwaliteitsopname. 95% van die monsters is as Graad SB1 gegradeer en agt is afgegradeer na klas ander sojabone (KASB). Sien **Tabel 1** vir 'n samevatting van die graderingsresultate verkry op 'n seleksie van die graderingsfaktore.

Van die monsters wat ontleed is vir die oesopname, is 15 ook getoets vir die teenwoordigheid van die CP4 EPSPS-geen (Roundup Ready) wat genetiese modifisering aandui. Die Envirologix QuickComb-toets is uitgevoer en al die monsters het positief getoets.

Sojabone is een van net 'n paar tipes plante wat 'n uitstekende kwaliteit proteïen voorsien en vorm wêreldwyd die hoofbron vir dierlike voedingsproteïene. Van die 748 318 ton sojabone in Suid-Afrika geprosesseer gedurende hierdie seisoen, is 3,6% aangewend vir menslike verbruik, 21,6% vir dierevoer en 74,8% gepeers om olie en oliekoek te produseer. Die hoeveelheid sojabone gepeers, het

meer as verdubbel sedert die 2010/2011-seisoen. Die proteïen-, vet- en as-waardes word gerapporteer as persentasies (g/100 g) op 'n droë- of vogvrye basis (db). Die gemiddelde proteïënhoud hierdie seisoen was 40,63% – 1,2% hoër as in die 2011/2012-seisoen.

Die gemiddelde vetinhoud van 18,8% stem baie goed ooreen met die 18,7% van verlede seisoen. Die as- of minerale inhoud van die twee seisoene is feitlik identies – hierdie seisoen 4,65% en die vorige seisoen slegs 0,03% laer. Sien **Grafiek 3 tot Grafiek 5** vir die gemiddelde proteïen-, vet- en as-inhoud per provinsie oor twee seisoene.


Die finale produksiesyfer vir die 2012/2013-sojaboonoes is vasgestel op 784 500 ton wat 'n 21% of 134 500 ton toename is vanaf die 2011/2012-seisoen. Hierdie styging in tonnemaat is moontlik gemaak deurdat die hoeveelheid landbougrond onder sojaverbouing toegeneem het tot 516 500 hektaar.

Die opbrengs het ook toegeneem van 1,38 ton/ha tot 1,52 ton/ha. Mpumalanga en die Vrystaat was verantwoordelik vir die produksie van 75% van die totale oes.

Vir meer inligting aangaande die plaaslike soja-oeskwaliteit, kan jy die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium se webtuiste besoek by www.sagl.co.za. Die verslae is ook hier beskikbaar in PDF-formaat.


TABEL 1: GRADERINGSKWALITEIT OOR TWEE SEISOENE.

KLAS EN GRAAD SOJABONE	2011/2012-SEISOEN			2012/2013-SEISOEN		
	SB1	KASB	GEMIDDELD	SB1	KASB	GEMIDDELD
Vreemde voorwerpe, insluitende klipies, ander graan en sonneblomsaad, %	0,26	0,79	0,34	0,45	1,20	0,49
Ander graan, %	0,06	0,31	0,10	0,06	0,91	0,11
Sojabone en gedeeltes van sojabone wat deur die 4,75 mm rondegatsif gaan, %	2,68	4,63	2,97	2,53	2,97	2,55
Gebrekkige sojabone op die 4,75 mm rondegatsif, %	5,62	7,39	5,89	1,49	12,29	2,07
Vuilgesmeerde sojabone, %	1,29	3,37	1,60	0,43	0,05	0,41
Aantal monsters	85	15	100	142	8	150




Grafiek 1: Persentasie sojabone en gedeeltes van sojabone wat deur die 4,75 mm rondegatsif gaan, per provinsie.







Grafiek 2: Persentasie vuilgesmeerde sojabone per provinsie.




Grafiek 3: Gemiddelde proteïeninhoud per provinsie (% db).



Grafiek 4: Gemiddelde vetinhoud per provinsie (% db).



Grafiek 5: Gemiddelde as inhoud per provinsie (% db). ■



SA Graan/Sasol Nitro foto-komposisie

Met dank aan die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust wat hierdie kwaliteitsopname moontlik gemaak het asook die Graan Silo Industrie en sy lede vir die neem en instuur van verteenwoordigende monsters.